

Teoria kwantowa vs czarne dziury



Andrzej Dragan

*Uniwersytet Warszawski
National University of Singapore*

What I cannot create,
I do not understand.

Know how to solve every
problem that has been solved

Why const \times \sqrt{v} PG

TO LEARN:

Bethe Ansatz Probs.

Kondo

2-D Haldane

Local Temp



Non-Local Central Hydro



$$\textcircled{1} f = u(r, a)$$

$$g = 4(r, z) u(r, z)$$

$$\textcircled{2} f = 2|r, a| (u, a)$$

\uparrow








$$X/Y > \pi$$


**w nieinercjalnych układach odniesienia
geometria nie jest euklidesowa,
a upływ czasu nie jest równomierny.**


przyspieszenie ~ grawitacja

















w nieinercjalnych układach odniesienia stan kwantowy ulega zmianie w porównaniu z obserwacjami w układzie inercjalnym.



przyspieszenie lub grawitacja mogą mieć wpływ na przebieg protokołów kwantowych, takich jak teleportacja.





















Effect of relativistic acceleration on continuous variable quantum teleportation and dense coding

Piotr T. Grochowski,^{*} Grzegorz Rajchel,[†] Filip Kiałka,[‡] and Andrzej Dragan[§]

*Institute of Theoretical Physics, Faculty of Physics, University of Warsaw,
Pasteura 5, 02-093 Warsaw, Poland*

(Received 12 January 2017; published 26 May 2017)





dziękuję!

